

## Ágyi poloska csapda

Hálósobánként 2 db monitorcsapdát kell az ágy alá a padlóra elhelyezni az ágytámla felőli végén. (Kiterjedt fertőzés gyanúja esetén más, szokásos ágyi poloska búvóhelyek környékére, pl. kedvenc TV néző fotel, stb. is tehetünk csapdát.) A kihelyezett csapdát egy hét után ellenőrizzük le. Ha a csapda 1 hét alatt nem fog semmit, ez nem garancia arra, hogy a szobában nem áll fenn fertőzöttség.

A védőfólia eltávolítását követően a csapda 4 hétig hatásos. Folyamatos monitorozás esetén a kihelyezett csapdákat 4 hét után cseréljük le újakra.

A csapda más rovarokat is befog(hat), ezért oda kell figyelni, hogy valóban ágyi poloska van-e a csapdában, amennyiben a más rovar összetéveszthető az ágyi poloska bármely fejlettségi fázisával.

Kiértékelést követően információt kapunk a fertőzöttség mértékéről, kiterjedéséről, eloszlásáról, így minden tekintetben hatékonyabb irtási stratégiát alkalmazhatunk (kezelt terület nagysága, irtószer szükséglet, stb.). Az irtószeres kezelést követően pedig gyorsan vissza tudjuk ellenőrizni az elvégzett irtás sikerességét. A csapda nem alkalmazható sikerrel:

- nem megfelelő kihelyezés esetén,
- rendkívül magas fertőzöttség esetén.