

# MURIBROM rágcsálóirtó blokk

## Muribrom

felhasználásra kész 20 grammos rágcsálóirtó blokk

Hatóanyag: 0,005% bromadiolon

Gyártja: QUÍMICA DE MUNGUÍA S. A., Derio Bidea 51,

Munguía, 48100, Spanyolország

OTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00084-0000

Biocid terméktípus: 14. rágcsálóirtó szer

Felhasználási terület: házi egér (*Mus musculus*) és vándorpatkány (*Rattus norvegicus*) elpusztítására

A rágcsálóirtó szer keserű anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

P102 Gyermkektől elzárva tartandó

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat

P280 Védőkesztyű használata kötelező (csak foglalkozásszerű felhasználás)

P300+310 LENEYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Felhasználás helye:

- zárt térben és az épületek környékén: egér

- és patkányirtásra

a szabadban: egér- és patkányirtásra

a csatorna rendszerben: patkányirtásra

A foglalkozásszerű felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:

A készítményt zárt térben, a szabadban illetve a csatorna rendszerben olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észkelhető.

A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.

Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében javasolt a különböző hatóanyagú készítmények felváltva történő alkalmazása.

A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

A rágcsálóirtó blokkokat az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

A csatornahálózat esővíznyelőiben és tisztítóaknáiban, illetve udvari vízfolyások aknájában a blokkot - rögzítő drót segítségével - úgy helyezzük el, hogy az ne érje el a víz szintjét, de ugyanakkor a patkányok könnyen fogyaszthassanak belőle. A blokkok léclábakon álló csatornahálózatokban is kihelyezhetők.

A Muribrom rágcsálóirtó blokk alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

5-10 méterenként 50 gramm csalétek.

A Muribrom rágcsálóirtó blokk alkalmazási dózisa patkányok irtásakor:

5-10 méterenként 100-200 gramm csalétek.

A Muribrom rágcsálóirtó blokk alkalmazási dózisa csatorna rendszerben:

etetőhelyenként maximum 200 gramm csalétek.

Forgalomba hozza:



EKOPREVENT KFT.  
1222 Budapest  
Komló utca. 10.  
www.ekoprevent.com



A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket - a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM - FVM - KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően - feltűnő jelzessel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevet, hatóanyagát, ellenszert, valamint az alkalmazó nevet, címet és telefonszámát.

- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket pontjuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószeret máshova.
- A véralvadást gátló hatóanyag kesellettett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása után néhány nappal várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg az a rágcsálók aktivitása indokolja.
- Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatosan kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kivanatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
- A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsálómérsétség érhető el. Amennyiben a rágcsálók irtása ezt követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtőközsé, az esetlegesen kiszóródott irtószeret takarítsuk fel.

Quimunsa  
Derio Bidea, 51  
48100 Munguía, Spain  
Tel: 946 741 085, Fax: 4829  
e-mail: info@quimunsa.com  
www.quimunsa.com



Tételszám  
Gyártás időpontja:  
Nettó tömeg:  
15 kg

Figyelmeztetés:

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!

Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dőgező állat mérgeződik, ha a rágcsálóirtó szerrel elpusztult vagy legyengült egeret vagy patkányt elfogyasztja.

Az irtószer kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezét kell mosni.

Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szer ne használjon.

Elemiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok aitala hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó. Intenzív szagú anyagoktól távol tartandó.

Ne juttassa a készítményt élővízbe.

Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók keresére rendelkezésre áll.

Elősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyeles esetén:

- Lenyeles esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozat, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- Szájüreget öblítse ki vízzel.
- Eszméletlen személynéknél semmit ne adjon át.

Bőrre jutáskor:

- Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítést.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény véralvadást gátló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálóirtó szer ilyesféle

követően csökkentheti a véralvadási képességet és belső vérzés jelentkezhet.

A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.

A készítményt lenyelő mérgezett állatoknál, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, nyírvérzés, vérvérzés, vörös vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, lirtelen fellepő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K<sub>1</sub>- vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett állatoknál és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke > 4, a mérgezettnek intravenásan K<sub>1</sub>- vitamint kell adni. A kezelést többszöri megismétlésre is szükség lehet.

Ellenszere: K<sub>1</sub>- vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fenyőtől védett, száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idő a csomagoláson.)

Hulladékkezelés:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezés megelőzése érdekében, az ellenőrzéssel párhuzamosan gondoskodni kell a kezeles során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA