

MURIBROM rágcsálóirtó pép

Muribrom

felhasználásra kész, filterpapír tasakokba kiszerelt rágcsálóirtó pép

Hatóanyag: 0,005% bromadiolon

Engedélytulajdonos és gyártó: QUÍMUNSA DE MUNGUÍA S. A., Derio Bidea 51, Munguía, 48100, Spanyolország

OTH engedélyszám: HU-2014-MA-14-00113-0000

A rágcsálóirtó szer keserű anyagot (denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P300+310 LENEYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

Forgalmazási kategória: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

Terméktípus	14. terméktípus
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása	A készítményt zárt térben az épületek környékén, és a szabadban olyan helyen alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása eszélhető.
Célszervezet (a fejlődési szakasz is beleértve)	házi eger (Mus musculus) és vándorpatkány (Rattus norvegicus) fiatal és ivarérett egyedei
Felhasználási terület	zárt térben és az épületek környékén: eger- és patkányirtásra
Az alkalmazás módja	kihelyezhető mérgezett csalétek
Az alkalmazás dózisa és gyakorisága	Egerek irtásakor: 5-10 méterenként 50 g csalétek Patkányok irtásakor: 5-10 méterenként 100-200 g csalétek
Felhasználói kör	foglalkozásszerű felhasználók

A foglalkozásszerű felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:

- A készítményt zárt térben, az épületek környékén és a szabadban olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása eszélhető.
- A nyomok vagy látható karokozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsalók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében javasolt a különböző hatóanyagú készítmények felváltva történő alkalmazása.
- A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden mas táplálékforrást tavolítsunk el.
- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó filterpapír tasakokat az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.
- Amennyiben etetőállomásonként 200 gramm csalétket alkalmazunk, úgy ehhez 200 gramm tömegű tasakokat használunk.
- A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESzCSM – FVM - KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően- felúnó jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevet, hatóanyagát, ellenszert, valamint az alkalmazó nevet, címét és telefonszámát.
- Az etetőhelyeket kezdetben naponta, utána 3-4 naponta ellenőrizzük és az elfogyasztott csalétket potoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. Az ellenőrzést ez követően hetente ismétlünk meg.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsalók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószer tashová.

Forgalomba hozza:



EKOPREVENT KFT.
1222 Budapest
Komló utca. 10.
www.ekoprevent.com

- A veralvadásgátló hatóanyag keselített hatása miatt a rágcsalók elpusztulása után néhány nappal várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsalók aktivitása indokolja.
- Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
- A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsalómentesség érhető el. Amennyiben a rágcsalók általa ez követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószer takarítsuk fel.

Óvintézkedések:

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződéhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legegynült egeret vagy patkányt elfogyasztja.
Bőrrel való érintkezés kerülendő. A termék használata közben használjon megfelelő védelmet nyújtó, !

Quimunsa
Derio Bidea, 51
48100 Munguía, Spain
Tel: 946 741 085, Fax: -4829
e-mail: info@quimunsa.com
www.quimunsa.com



Tételszám
Gyártás időpontja:
Nettó tömeg:
15 kg

EU minőségstanusítvánnyal rendelkező védőkezesyt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezelni kell mosni.

Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

Intenzív szagú anyagoktól távol tartandó.

Ne juttassa a készítményt élővízbe.

Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók keresere rendelkezésre áll. Elsősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni Lényeles esten:

• Lényeles esten azonnali toraujiuon orvoshoz és mutassa meg a termék

dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

• Hánytatas csak az orvos kifejezett utasítására történhet.

• Szájüregét öblítse ki vízzel.

• Eszméletlen személynék semmit ne adjon át.

Bőrré jutaskor:

• Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.

• A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.

• Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

• A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.

• Ha a szemben kontaktense van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.

• Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Utmutatás az orvosnak:

A készítmény veralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a veralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.

A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.

A készítményt lenyelő mérgezett állatokról, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, invérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb veralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észli, adjon K₁- vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett állatokról és az expozíció követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke > 4, a mérgezettnek intravénásan K₁- vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Ellenszere: K₁- vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idő a csomagoláson.)

Hulladékkezelés:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezés megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsalók elváltásáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsalók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások:

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtjük össze a megmaradt irtószer, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétkállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószer feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószeret veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

FOGLALKOZÁSSZÉRU FELHASZNÁLÁSRA