



MURIBROM® RÁGCSÁLÓIRTÓ BLOKK

MURIBROM® RÁGCSÁLÓIRTÓ BLOKK
Zárt, lételetlen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó, felhasználásra kész 20 g-os rágcsőirtó blokk.
14. forgalmi kategóriájú irtószér

Figyelemztető mondatok: Károsíthatja a születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket (vér).

Övintézkedésre vonatkozó mondatok: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági övintézkedés el nem olvasta és nem értette. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Vedőkesztyű használata kötelező. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Rosszullet esetén orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a fél nem használt irtószér és a csomagolóanyag veszélyes hulladéknak minősül.

ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS

Felhasználás 1 - egerek és/vagy patkányok - beltéri

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is): *Rattus norvegicus*-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek
Mus musculus-házi egér-fiatal és ivarérett egyedek

A felhasználás mértéke és gyakorisága: házi egér irtásakor 60-100 g/etetőállomás, patkányok irtásakor 100-200 g/etetőállomás

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások: A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradt terméket. Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések: Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékozassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsőirtásról. Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsőirtók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsőirtó a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újabb a területen. A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakra, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelést alatt elpusztult rágcsőirtókat. A terméket ne használja tartósan csálékként a rágcsőirtók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsőirtó aktivitás kimutatására. Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel. Ez a termék kizárólag olyan helyeken használható, amelyek gyermekek vagy nem célzott állatok számára nem hozzáférhetőek.

A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó övintézkedések: Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csáléket ne érje víz.

Felhasználás 2 - egerek és/vagy patkányok - kültéren épületek körül

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) *Rattus norvegicus*-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek
Mus musculus-házi egér-fiatal és ivarérett egyedek

A felhasználás mértéke és gyakorisága: házi egér irtásakor 60-100 g/etetőállomás, patkányok irtásakor 100-200 g/etetőállomás

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások: Védje a csáléket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki. Szereljen ki az etetőhelyen minden olyan csáléket, amelyet a víz megromgalt vagy amely elszennyeződött. A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradt terméket. Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések: Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékozassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsőirtásról. Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsőirtók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsőirtó a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újabb a területen. A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakra, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelést alatt elpusztult rágcsőirtókat. A terméket ne használja tartósan csálékként a rágcsőirtók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsőirtó aktivitás kimutatására. Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel. Ne alkalmazza a terméket közvetlenül uregekben.

A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó övintézkedések: Ha az etetőhelyek felszíni vizet (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csáléket ne érje víz.

Felhasználás 3 - patkányok - nyílt terület, hulladéklarakó

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is): *Rattus norvegicus*-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek

A felhasználás mértéke és gyakorisága: patkányok irtásakor 100-200 g/etetőállomás 20, 25, 30, 50 és 100 grammos blokkokat használva legfeljebb 200 gramm; 20, 25, 30, 50 és 100 grammos blokkokat használva legfeljebb 100 gramm

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások: Védje a csáléket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki. Szereljen ki az etetőhelyen minden olyan csáléket, amelyet a víz megromgalt vagy amely elszennyeződött. A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradt terméket. Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések: Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékozassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsőirtásról. A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakra, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelést alatt elpusztult rágcsőirtókat. A terméket ne használja tartósan csálékként a rágcsőirtók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsőirtó aktivitás kimutatására. Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel. Ne alkalmazza a terméket közvetlenül uregekben.

A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó övintézkedések: Ha az etetőhelyek felszíni vizet (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csáléket ne érje víz.

Felhasználás 4 - patkányok - csatorna

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is): *Rattus norvegicus*-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek.

A felhasználás mértéke és gyakorisága: patkányok irtásakor 100-200 g/csatomafedel 20, 25, 30, 50 és 100 gramm

Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások: A csáléket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje víz, és ne mosódhasson el. Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat. Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a csáléket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez. Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK: Használat előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítőskor átadott összes információt. Végezzen előzetes felmérést a csálétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcső fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzötté legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében. Távolítsa el a rágcsőirtók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiomlott gabonát vagy élelmiszer-hulladékok). Ettől eltérve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcső populációt, és nehezebbé teszi a csálétek elfogadását. A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket. A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsőit aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányrak-trak, nyílások, uregek stb.). Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni. Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsőirtóirtó fártalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni. Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazza, a kezelt területet meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csálétek mellett tájékoztatást kell feltüntetni, amely ismerteti a véralvadástól által okozott elsőleges vagy másodlagos mérgezés veszélyét, valamint az elsősegély-nyújtási intézkedéseket mérgezés esetén. A csáléket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról. A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, hasznosállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el. A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezelekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el. Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során. A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazását után mosson kezeit, és mossa meg a termékek közvetlenül érintkező bőrfelületét. A kezelt területet ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén vezetett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal. Ha a csálétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló mértékéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csálétek formuláció választását. Ha a 35 napos kezelési időszak után a csálé-

ket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcső aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot. Amennyiben minden más okot kizár, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsőirtók, így vegye fontolóra nem véralvadástól rágcsőirtókat, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadástól rágcsőirtókat használhat. Alternatív védekezési intézkedéseket vegye fontolóra csapadék alkalmazását.

KOCKÁZATSZÖKENTŐ INTÉZKEDÉSEK: Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékozassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsőirtásról. A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzés követelményeinek megfelelően (pl. "kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak"). Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn. A termék 25 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább. A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felújítva hasonló vagy kisebb hatékonyaságú véralvadástólátókat! Változt alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsőirtó szert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadástólátó hatóanyagot használjon. Az eltárolt és védett rágcsőirtó pontokon használja csapadékat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel. A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsőirtók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

VÁRHATÓ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HATÁSOK RÉSZLETES LEÍRÁSA, AZ ELŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELŐÍRÁSOK ÉS A KÖRNYEZET-VEDELMI ÖVINTÉZKEDÉSEK: A termék véralvadástólátó anyagot tartalmaz. Lenyeles esetén – adott esetben késleltetve jelentkező – tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben borbérvérzés, vörös vizelet vagy széklet is előfordulhat. Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin. **Továbbá:** Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappánnal. Szembe kerülés esetén: Ha a sérült visszi kontaktlencsét, távolítsa el, majd néhány percig öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Szába kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Tilos hanyattlani! Lenyeles esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha haziallást nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz. Veszélyes a vadon élő állatokra. Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „Illos elmozdítani vagy kinyitni”, „rágcsőirtó szert tartalmaz”, „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. **(Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 12 99)***”, továbbá, a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban az alkalmazott rágcsőirtó szert megnevezését, hatóanyagát, az ellenmérget, vagy gyógyszert megnevezését és a szolgáltató nevet, címet, telefonszámát szintén fel kell tüntetni az etetőállomásokon.

A TERMÉK ÉS CSOMAGOLÁSA BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: Az eredeti céljára fel nem használt, hulladékká vált irtószert és etetőállomások veszélyes hulladékként kell kezelni.

A TERMÉK TÁROLÁSI FELTÉTELEI ÉS ELTARTHATÓSÁGI IDEJE SZOKÁSOS TÁROLÁSI FELTÉTELEK MELLETT: Szárz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó. Gyermekek, madarak, háziállatok és hasznosállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó. Szavatossági idő: 2 év

EGYÉB INFORMÁCIÓK: A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadástólátó rágcsőirtó a csálétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását. A rágcsőirtók betegséget hordozhatnak. Értékelőitask során az elpusztult rágcsőirtókat ne érintse meg púztá kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót. A termék keseru anyagot és festéksanyagot tartalmaz.

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Tétel száma és lejáratí dátuma:

OTH Engedélyszám: HU-2014-MA-14-00084-0000

Hatóanyaga:

Bromadiolon.....0,005%



Engedélytulajdonos és gyártja:
Quimica de Munigua S.A.
Derio Bidea 51 48 100 Munigua, Spanyolország
Tel: (+34) 946 741 085 www.quimunsa.com

VEZSÉLY

Nettó tömeg:

15 Kg