



MURIBROM® BRODIFAKUM RÁGCSÁLÓIRTÓ BLOKK

BLOKK

MURIBROM® BRODIFAKUM RÁGCSÁLÓIRTÓ BLOKK

A rágcsálóiirtó blokk keserű iz anyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását. Károsíthatja a születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szervezetet (vér). Gyermekektől elzárva tartandó. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Vedőkesztyű használata kötelező. Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni. Rosszullát esetén orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként a helyi előírások szerint.

Forgalmazási kategória: II. forgalmazási kategóriájú irtószerek
Terméktípus 14. terméktípus – Rágcsálóiirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása

A készítményt zárt térben és kültérben, az épületek környékén olyan helyen alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.

Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve) házi egér (*Mus musculus*), vándorpatkány (*Rattus norvegicus*) és házi patkány (*Rattus rattus*) fiatal és ivarérett egyedei

Az alkalmazás módja kihelyezhető mérgezett csalétek

Az alkalmazás dózisa és gyakorisága

Egerek irtásakor: rágcsálóirtó dobozban legfeljebb 40 g csalétek 2-5 m-ként.

Patkányok irtásakor: rágcsálóirtó dobozban legfeljebb 100 g csalétek 5-10 m-ként.

A foglalkozásszerű felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:

A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, hogy milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében javasolt a különböző hatóanyagú készítmények felváltva alkalmazása. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el. A rágcsálóiirtó blokkot az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát. Az etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként ellenőrizzük, a kiürült rágcsálóirtó dobozokat cseréljük le. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folytatassuk, amíg a rágcsálók általa teljesen meg nem szűnik. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létszámunk több etetőhelyre, az egyes etetőhelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne növeljük. Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova. A vérérvadástól hatóanyag készletetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztása után 4-5 nappal várható. Indokolatlanul ne használjuk

a csalétek folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni. A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsálomentesség érhető el. Amennyiben a rágcsálók általa ezt követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A kezelés után az etetőállomásokot gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések:

A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Kockázatsökkentő intézkedések:

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A rágcsálóirtó blokk keserű iz anyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását. A csalétek olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezét kell mosni. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült egereket vagy patkányt elfogyasztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni! Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel. Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók keresésére rendelkezésre áll. Elelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak!

Lenyelés estén:

Lenyelés estén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet. Szájüreget öblítse ki vízzel. Esméletlen személynek semmit ne adjon át.

Bőre jutáskor:

Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki. Ha a szemben kontaktencia van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény vérérvadástól hatóanyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a vérérvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet.

A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet. A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, ilyvérzés, vérköpes, véres vizelet, hosszabb vérérvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1- vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíció követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke > 4, a mérgezettnek intravenásan K1- vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Ellenszere: K1- vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtjük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokot. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószert feltakarításáról. Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett:

Eredeti, zárt csomagolásban, illetékellenektől elzárt, fénytől védett, száraz, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idő a csomagoláson.)

UFI: FA20-JOWP-1005-P7FH

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-14-00155-0000

Hatóanyag:
Brodifakum.....0,005%

Tétel száma és lejárat dátuma:



VESZÉLY



Engedélytulajdonos és gyártó: QUÍMICA DE MUNGUÍA S. A.,
Derío Bidea 51, Munguia, 48100, Spanyolország
Tel: (+34) 946 741 085 www.quimunsa.com

Nettó tömeg:

10 Kg

6105309-1