



MURIBROM® BRODIFAKUM RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP

PÉP

MURIBROM® BRODIFAKUM RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP

A rágcsálóirtó pép keserű iz anyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását. A felhasználásra kész rágcsálóirtó.

LENYELÉS ESETÉN

azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék címkéjét. Károsíthatja a születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér). Gyermekektől elzárva tartandó. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem érte. Védőkesztyű használata kötelező. Expozíció vagy annak gyanúja esetén orvosi ellátást kell kérni Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően.

Forgalmazási kategória: II. forgalmazási kategóriájú, irtószér

Terméktípus 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása

A készítményt zárt térben és kültéren, az épületek körül olyan helyen alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok előfordulása észlelhető.

Célszervezet (a fejlődési szakaszt is beleértve) házi egér (*Mus musculus*), vándorpatkány (*Rattus norvegicus*) és házi patkány (*Rattus rattus*) fiatal és ivarérett egyedei

Az alkalmazás dózisa és gyakorisága

Egerek irtásakor: 100 négyzetméterenként 2 db (40 g) tasak pép

Patkányok irtásakor: 100 négyzetméterenként 3-5 db (60-100 g) tasak pép

A csalétket zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétkállomásban kell elhelyezni.

A foglalkozásszerű felhasználásra vonatkozó specifikus előírások:

A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, hogy milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e. A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében javasolt a különböző hatóanyagú készítmények felváltva történő alkalmazása. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el. A rágcsálóirtó pepet tartalmazó tasakot az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásaival összhangban - feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát. Az etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként ellenőrizzük, a kiürült rágcsálóirtó dobozokat cseréljük le. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártaalma teljesen meg nem szűnik. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne növeljük. Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert

máshova. A vérárvadástgató hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztása után 4-5 nappal várható. Indokolatlanul ne használjuk a csalétket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni. A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 6 hét alatt teljes rágcsálóméretesség érhető el. Amennyiben a rágcsálók ártaalma ezt követően is tapasztalható, a jelenség okát fel kell deríteni és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A kezelés után az etetőállomásokot gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatsökkentő intézkedések:

A termék használata közben viseljen megfelelő védelmet nyújtó, EU minőségtanúsítvánnyal rendelkező védőkesztyűt.

A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

Kockázatsökkentő intézkedések:

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A rágcsálóirtó pép keserű iz anyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását. A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és házimalakok, madarak, valamint más, nem célszervezet állatok nem férhetnek hozzá. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezét kell mosni. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutyra, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögevő állat mérgeződéhet, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy legyengült egeret vagy patkányt elfogyasztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni!

Beszennyezett, romlott rágcsálóirtó szert ne használjon fel. Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll. Elélmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz és a címkét mutassa meg az orvosnak!

Lenyelés estén:

Lenyelés estén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját. Hánytátás csak az orvos kifejezett utasítására történhet. Szájüreget öblítse ki vízzel. Esméletlen személynek semmit ne adjon át.

Bőrré jutások:

Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki. A bőrt bő szappanos vízzel mossa le. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki. Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény vérárvadástgató hatóanyagot, brodifakumot tartalmaz. A rágcsálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a vérárvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet. A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, nyivérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb vérárvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K1- vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor mérgezett ellátásakor és az expozíció követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke > 4, a mérgezettnak intravénásan K1- vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet. Ellenszere: K1- vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétkállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószér feltakarításáról. Az eredeti céljára fel nem használt, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett:

Eredeti, zárt csomagolásban, illetéktelenektől elzárt, fénytől védett, száraz, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idő a csomagoláson.)

Uf: 0K20-20YU-X00N-P86Q



VESZÉLY

KIZÁRÓLAG SZAKKÉPZETT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

NNK engedélyszám: HU-2016-MA-14-00163-0000

Tétel száma és lejárat dátuma: 1

Hatóanyag:

Brodifakum.....0,005%



Engedélytulajdonos és gyártó: QUÍMICA DE MUNGUÍA S. A.,
Derio Bidea 51, Munguía, 48100, Spanyolország
Tel: (+34) 946 741 085 www.quimunsa.com

6100507-1

Nettó tömeg:

15 Kg